

# Kompenzační tabulka

## hodnocení rozsahu trvalých následků úrazu

Kompenzační tabulka obsahuje seznam tělesných poškození způsobených úrazem, na něž se vztahuje pojištění, a slouží k určení rozsahu trvalých následků úrazu.

Výši pojistného plnění stanoví revizní lékař pojistitele na základě předložených lékařských zpráv, a to ve výši procentního podílu z limitu pojistného plnění.

I. Tělo	
A. Ruka, paže, rameno	
1) Prsty	
Ztráta všech prstů na jedné ruce	50 %
Ztráta palce a metakarpálních kůstek	30 %
Ztráta palce	25 %
Ztráta poloviny konečku palce	8 %
Palec s neohebným článkem	5 %
Ztráta jednoho prstu	10 %
Ztráta každého dalšího prstu	15 %
Ztráta krajního článku prstu	5 %
Prst s neohebným článkem	5 %
2) Ruka, zápěstí	
Ztráta jedné ruky	55 %
Neohebnost v dobré pracovní poloze	10 %
Neohebnost ve špatné pracovní poloze	15 %
Zlomenina vřetenní kosti, zhojená s vykloubením a mírnou poruchou funkce	5 %
Následky zlomeniny vřetenní kosti od ukazováku až po malík, snížení až o 2 cm od dlaně ruky	18 %
3) Paže	
Ztráta paže	70 %
Amputace v nadloktí	65 %
Amputace v předloktí	60 %
Nezhojené přetržení dvojhlavého svalu	5 %
Srážení krve v cévách v podpaží	5 %
4) Loket	
Neohebnost v natažené poloze	25 %
Funkce natáčení v předloktí ustala („vztyčená poloha“)	20 %
Nedostatečné natažení (40° až 90°)	5 %
5) Rameno	
Veškerá pohyblivost se počítá s neusazenou lopatkou Neohebnost v rameni (paže svěšena podél těla)	35 %
Zdvižení až do 90°	15 %
Tření a určité snížení pohyblivosti	5 %
Opakující se luxace	10 %
Akromioklavikulární luxace	5 %

6) Paralýza	
Celková paralýza pažního nervového svazku	70 %
Celková paralýza radiálního nervu v nadloktí	25 %
Celková paralýza loketního nervu	30 %
Celková paralýza mediálního nervu, poranění jak smyslové, tak motorické	35 %
Pouze u poranění smyslových	10 %
B. Chodidlo, noha, kyčle, paralýza	
1) Chodidlo	
Ztráta chodidla s dobrou funkcí protézy	30 %
Ztráta chodidla se špatnou funkcí protézy	35 %
Amputace nártu, pahýl schopný unést tělo	15 %
Ztráta všech prstů u nohy	10 %
Ztráta palce u nohy	5 %
Nepohyblivý kloub kotníku v pravém úhlu nebo mírné vybočení (koňská noha)	15 %
Kloub kotníku - ustala pohyblivost v natočení	5 %
2) Noha	
Ztráta jedné nohy	65 %
Amputace v koleni nebo ve stehně s dobrou funkcí protézy	50 %
Amputace v koleni nebo ve stehně se špatnou funkcí protézy	55 %
Ztráta bérce (holeně) s protézou	30 %
Zkrácení nohy o 3 cm a více	10 %
Nepohyblivé koleno	25 %
Koleno, jehož možnost ohybu je snížena na 90° nebo méně	10 %
Koleno s rušivou uvolněností	10 %
Opakující se luxace čéšky	5 %
Ztráta čéšky	7 %
Dobře fungující celá umělá čéška	15 %
3) Kyčle	
Nepohyblivá kyčel v příznivé poloze	30 %
Kyčel se silnou nedostatečností její funkce	50 %
Dobře fungující celková umělá náhrada kyčelního kloubu	10 %

4) Paralyza	
Celková paralyza nervu lýtkového	10 %
Celková paralyza nervu stehenního	20 %
Částečná ztráta hybnosti sedacího nervu - s dobrou pohyblivostí	10 %
Částečná ztráta hybnosti sedacího nervu - se špatnou pohyblivostí	30 %

## II. Hlava

### A. Obličej, mozek, zrak, sluch

#### 1) Obličej

Ztráta zubů (nejméně 3)	5 %
Skalpování	5 %
Jednostranná paralyza obličejového nervu	10 %
Oboustranná paralyza obličejového nervu	15 %
Ztráta čichu	10 %
Paralyza hlasivek s obtížemi při řeči	10 %
Paralyza trojklaného nervu v obličejové části	5 %
Trvalé zjizvení - jizvy do 4 cm	5 %
Trvalé zjizvení - jizvy 4 - 10 cm	7 %
Trvalé zjizvení - jizvy nad 10 cm	9 %

#### 2) Mozek

Mírná demence	15 %
Středně silná demence	25 %
Silná demence	50 %
Postkomoční syndrom	8 %

#### 3) Zrak

Ztráta jednoho oka	40 %
Ztráta obou očí	100 %
Ztráta vidění na jedno oko	25 %
Ztráta vidění na obě oči	100 %
Ztráta binokulárního vidění	15 %
Výpad zorného pole (hemianopsie)	40 %
Ztráta vidění na jedno oko s možností zlepšení po operaci	18 %
Dvojité vidění	10 %

#### 4) Sluch

Ztráta sluchu na jedno ucho	10 %
Ztráta sluchu na obě uši	75 %
Ztráta vnějšího ucha	10 %

## III. Páteř, krk a mícha

### 1) Páteř

Omezení hybnosti páteře lehkého stupně	8 %
Omezení hybnosti páteře středního stupně	16 %
Omezení hybnosti páteře těžkého stupně	25 %
Pouřazové poškození páteře a míchy nebo míšních kořenů lehkého stupně	25 %

Pouřazové poškození páteře a míchy nebo míšních kořenů středního stupně	40 %
Pouřazové poškození páteře a míchy nebo míšních kořenů těžkého stupně	80 %
Omezení hybnosti - nutnost nošení korzetu	8 %
Následky vychýlení ploténky	12 %

### 2) Krk, krční páteř

Ztráta hlasu	20 %
Stav po úrazu průdušnice s trvale zavedenou kanylou	35 %
Stav po tacheotomii s trvale zavedenou kanylou	50 %
Omezení hybnosti - je zapotřebí zpevňující límec	12 %
Vystřelující bolest - kořenové dráždění	12 %

### 3) Poranění hřbetní míchy

Mírné trvalé následky bez změn na močovém měchýři (pravděpodobné pomočování) - objektivně určitelné neurologické symptomy v mírném měřítku	20 %
Mírné trvalé následky se změnami na močovém měchýři (pravděpodobné pomočování) - objektivně určitelné neurologické symptomy v mírném měřítku	25 %
Ostatní trvalé následky bez symptomů na moč. měchýři	30 %
Ostatní trvalé následky se symptomy na moč. měchýři	35 %

## IV. Srdce a plíce

Zasažení srdce a plic se posuzuje s přihlédnutím k omezení funkční kapacity, které je onemocněním způsobeno. K tomuto účelu se používá následujícího rozdělení do skupin:

1. Bez omezení fyzické činnosti	3 %
2. Mírné omezení fyzické činnosti, příznaky se objevují pouze při namáhavé činnosti	20 %
3. Podstatné omezení fyzické činnosti (příznaky se projevují již při málo náročné činnosti)	45 %
4. Jakákoli forma fyzické činnosti způsobuje objevení se příznaků, které se mohou vyskytovat i v době klidu	70 %
FEV přes 2 litry odpovídá funkční skupině 1	
FEV mezi 1,5 až 2 litry odpovídá funkční skupině 2	
FEV přibližně 1 litr odpovídá funkční skupině 3	
FEV 0,5 litru odpovídá funkční skupině 4	

## V. Břišní dutina a pánev

Ztráta sleziny	5 %
Ztráta jedné ledviny	10 %
Dobře fungující transplantovaná ledvina	25 %
Uměle vytvořený vývod střeva navenek	10 %
Mírná inkontinence (např. nutkavé močení ev. i vypr. stolice)	10 %
Expulzivní inkontinence	25 %
Břišní kýla, neoperovatelná	20 %
Ztráta obou varlat	10 %
Ztráta obou vaječníků před menopauzou	10 %
Zúžení močového, pokud se musí používat dilatátor	15 %